

Terroir

(n-m) ensemble des facteurs naturels (*climat, sol, sous-sol*) et humains (*technique et savoir-faire*) qui président à la culture de la vigne et à l'élaboration des vins.

Assemblage

	Assemblage	Rendement moyen	Date de vendanges
Cabernet-Sauvignon	50%	47hl/ha	02-oct
Merlot	41%	52hl/ha	20-sept
Cabernet-Franc	2%	45hl/ha	26-sept
Petit Verdot	7%	44hl/ha	27-sept

NOTES

33460 MARGAUX-FRANCE

Contact : lvdh33@wanadoo.fr - <http://www.chateaumonbrison.com>

Telephone: +33 (0)5.56.58.80.04 - Fax: +33 (0)5.56.58.85.33



CHÂTEAU MONBRISON



GRAND VIN

DE

Margaux

2006

Campagne 2006

Bilan pluviométrique Légèrement supérieur à celui de 2005, mais cependant bien en dessous de la moyenne.

- **Février et Mars**, bien arrosés entraînent un débourrement sans problèmes, suivi par une période de sécheresse sur Avril/Mai/Juin (déficit de 50% par rapport à la normale).

- **Juillet/Août** plus proche de la normale avant un mois de Septembre plus atlantique (Margaux : 95 – Pessac : 95 – Pauillac : 120 – St Estèphe : 130 – Sauternes : 150)

Températures Proches de la normale lors de la reprise de végétation.

- **Mai/Juin** : Températures voisines de 2005.

- **Juillet et Septembre** : Plus chaudes que ces 3 dernières années en revanche Août plus frais.

Physiologie / Maturité Débourrement plus tardif que la moyenne (idem à 2005). Mi Avril : Merlots – 20/25 Avril : Cabernets. Mais en Mai les températures augmentent entraînant une progression rapide de la vigne.

Premières fleurs Fin Mai avec les faibles pluviométries d'Avril/Mai et Juin apparaissent des contraintes hydriques précoces (donc faible grossissement des baies) entre nouaison et fermeture. Mais à partir de Juillet, les précipitations atténuent cette contrainte et la vigne reprend un peu sa croissance (justifiant la décision de

vendanges en vert et d'un 2^{ème} effeuillage pour favoriser la maturation).

Protection du vignoble Premières attaques de Mildiou précoces et virulentes, d'où une protection précoce pour une campagne sereine, mais la pression augmente à partir de fin Juin et se maintient jusqu'aux vendanges.

D'où une bonne qualité de pulvérisation, positionnement judicieux et rognages réguliers sont nécessaires pour maintenir un feuillage de qualité jusqu'au bout.

Botrytis Conditions climatiques favorables à l'installation précoce. Cependant les traitements aux moments clés, protection sans faille contre le ver de grappe, avec un suivi rigoureux des mesures prophylactiques permettent de maintenir les grappes saines jusqu'en Septembre.

Les fortes pluies de Septembre entraînent un grossissement des baies. Cependant, limité par les itinéraires d'entretien du sol (maintien d'une concurrence, sols non travaillés pendant la maturation).

Le Vignoble

13ha20 à 30 ans - 7 500 pieds/ha - Graves profondes

Ebourgeonnages - Effeuillements manuels

Vendanges manuelles en cagettes - Double tri

Températures contrôlées - Extractions raisonnées

Eleveage 18 mois en barriques 100 % barriques chêne Français

(dont 40 % Barriques Neuves)